

ኮቪድ-19 እና ትምህርት ቤት፡ ለወላጆች እና ለሠራተኞች መመሪያ

እራስዎን እና ሌሎችን እንዴት መጠበቅ የችላሉ



ስለ ኮቪድ-19 ይወቁ

- ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ከሰው ወደ ሰው የሚዛመት በቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው።
- ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር በቅርብ ግንኙነት (ወደ 6 ሜትር ያህል) ቢጠጉ በበሽታው ሊጠቁ ይችላሉ።
- በበሽታው የተያዘ ሰው ሲያስል፣ ሲያስነጥስ ወይም ንግግር ሲያደርግ በሚወጡ የመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች በበሽታው ሊጠቁ ይችላሉ።
- እንዲሁም ቫይረሱ አላዩ ላይ ካለ ገጽ ወይም ዕቃ በመንካት እና ከዚያም አፍዎን፣ አፍንጫዎን ወይም ዐይንዎን በመንካት በቫይረሱ ሊያዙ ይችላሉ። ሆኖም ይህ ቫይረሱ የሚሰራጨበት ዋናው መንገድ ነው ተብሎ አይታሰብም።

እራስዎን እና ሌሎችን ከኮቪድ-19 ይከላከሉ

- በትምህርት ቤት እና በሌሎች የህዝብ ቦታዎች ላይ አፍንጫዎን እና አፍዎን የሚሸፍን የጨርቅ ማስከ (በሥዕሉ ላይ እንደሚታየው) ያድርጉ።
- በተደጋጋሚ የሚነኩ ቁሶችን ማጽዳትና በፀረ-ተባይ ማጥራት።
- እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ይታጠቡ ወይም ቢያንስ 60% የአልኮል መጠን ያለው የእጅ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።



ፈጣን የኮቪድ-19 ራስን መፈተሻ	አዎ	አይ
ምርመራው ኮቪድ-19 እንደተገኘብኝ አሳይቷል?		
የ ኮቪድ-19 ምርመራ ውጤቱን እየጠበቅኩ ነው? (ለምሳሌ፣ ምርመራ የተደረገልኝ ህመም ስለተሰማኝ ነው ወይንስ በስራ ቦታ ላይ ምርመራ ስለተደረገልኝ ነው)		
በገጽ 2 ላይ የተዘረዘሩ የኮቪድ-19 ምልክቶች አሉኝ?		
ኮቪድ-19 ካለበት ወይም ሊይዘው ከሚችል ሰው ጋር በቅርብ ተገናኝቻለሁ? (ሊይዘው የሚችል ሰው ጉዳይ በገጽ 3 ላይ ተብራርቷል።)		
በሐኪም ወይም በተከታታይ ባለሙያ ከሥራ ወይም ከትምህርት ቤት ቀርቼ በቤት እንድቆይ ተነግሮኛል		
 ለማንኛውም ጥያቄ መልሱ አዎ ከሆነ ወደ ትምህርት ቤት አይሂዱ። 		

እርስዎ ወይም ልጅዎ ከታመሙ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል

የኮቪድ-19 ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡



ራስ ምታት፣ የጉርሮ ህመም እና የአፍንጫ ፍሳሽም ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። በ [cdc.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus) ላይ የበለጠ ይወቁ።

እርስዎ ወይም ልጅዎ በ ኮቪድ-19 ምልክቶች ከታመሙ፡

- ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት አይሄዱ። ህክምና ለማግኘት ካልወጡ በስተቀር በቤትዎ ይቆዩ።
- ድንገተኛ ሁኔታ ካጋጠምዎ ወደ 911 ይደውሉ። የድንገተኛ ሁኔታ ምልክቶች የመተንፈስ ችግር፣ የደረት ህመም፣ አዲስ ግራ መጋባት፣ ነቅቶ መቆየት አለመቻል እና ሰማያዊ ከንፈር ወይም ፊት መኖርን ያጠቃልላል።
- ለሐኪም ይደውሉ። የኮቪድ-19 ምርመራ ያስፈልግዎት እንደሆነ ሃኪምዎ ይወስናል።
- ሀኪም ከሌልዎት www.lghealthurgentcare.org ን መነበኘት እና ከሰባቱ አንዱን የፔን መድኃኒት ኤልጂ ጤና አስቸኳይ እንክብካቤ ቦታዎችን ጋር መደወል ወይም የመስመር ላይ የቪዲዮ ጉብኝት በLGHealth.org/OnDemand ማዘጋጀት ይችላሉ።

ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት መቼ እንደሚመለሱ

በመጀመሪያ ሐኪምዎን ያነጋግሩ እና የሐኪምዎን ምክር ይከተሉ። ለ ኮቪድ-19 ምርመራ ከወሰዱ ውጤትዎን በሚጠብቁበት ጊዜ ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት አይሄዱ።

- **ሃኪምዎ ለኮቪድ-19 ምርመራ የማይሰጥዎ ከሆነ፡** ምልክቶችዎ ሲጠፉ ወይም ሃኪምዎ ወደ ትምህርት ቤትዎ መመለሻ ማስታወሻ ሲሰጥዎ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ።
- **ሃኪምዎ ለኮቪድ-19 ምርመራ ከሰጡዎ እና እርስዎ ኮቪድ-19 ከሌለብዎ** ምልክቶችዎ ሲጠፉ ወይም ሃኪምዎ ወደ ትምህርት ቤትዎ መመለሻ ማስታወሻ ሲሰጥዎ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ።
- **ሃኪምዎ ለኮቪድ-19 ምርመራ ከሰጡዎ እና እርስዎ ኮቪድ-19 ካለብዎ፡** በገጽ 3 ላይ ያሉትን ምክሮች ይከተሉ።

እርስዎ ወይም ልጅዎ ኮቪድ-19 ካለብዎት ምን ማድረግ አለብዎ

ለትምህርት ቤትዎ እና ለቅርብ ሰዎችዎ ይገኙ

- ልጅዎ ኮቪድ-19 እንዳለበት ለማሳወቅ የልጅዎን ትምህርት ቤት ያነጋግሩ።
- በትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ ኮቪድ-19 እንዳለበት ለማሳወቅ እባክዎ ሥራ አስኪያጅዎን ወይም የህዝብ ግንኙነት ክፍልን ያነጋግሩ።
- ቅርብ ግንኙነት ላሎት ሰዎች ሻይረሱ እንዳለበት ያሳውቁ። የቅርብ ግንኙነቶች ማለት አብረዎቸው የሚኖሩ ሰዎች እና ለመጀመሪያ ጊዜ ህመም ከመሰማትዎ ከ48 ሰዓታት በፊት ከእርስዎ በ 6 ጫማ ርቀት ውስጥ ከ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ የቆዩ ሰዎች ናቸው።

ሊሆን የሚችል ጉዳይ ምንድነው?
 ኮቪድ-19 ከያዘው ሰው ጋር ከተገናኙ በኋላ የኮቪድ-19 ምልክቶችን ካዩ በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉትን መመሪያዎች መከተል አለብዎት። ለኮቪድ-19 ምርመራ እስኪያደርጉ ድረስ ሊኖርብዎት ይችላሉ ብሎ መገመት በጣም አስተማማኝ ነው።
 ይህንን “ሊሆን የሚችል ጉዳይ” እንለዋለ።

ራስዎትን ይንከባከቡ




- ዕረፍትን ያግኙ እና ፈሳሽ ነገር ይውሰዱ።
- ጥሩ ስሜት እንዲሰማዎት ለማግኘት እንደ acetaminophen (Tylenol) ያሉ በመድኃኒት መደብር ያለ ሐኪም ትዕዛዝ መገዛት የሚችሉ መድኃኒቶችን ይውሰዱ።
- ምልክቶችዎ እየባሉ ከሄዱ ወይም ትንፋሽ እጥረት ካለብዎ ለሐኪምዎ ይደውሉ።
- ሀኪም ከሌልዎት www.lghealthurgentcare.org ን መነገጥን እና ከሰባቱ አንዱን የፔን መድኃኒት ኤልጂ ጤና አስቸኳይ እንክብካቤ ቦታዎችን ጋር መደወል ወይም የመስመር ላይ የቪዲዮ ጉብኝት በLGHealth.org/OnDemand ማዘጋጀት ይችላሉ።
- በአተነፋፈስ ላይ ከባድ ችግር ካለብዎ ወይም ሌላ የድንገተኛ ሁኔታ ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ካሉ ወደ 911 ይደውሉ።

በቤትዎን ይቆዩ እና ከሌሎች ይራቁ (እራስን በማግለል)

- ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት አይሂዱ። የሕክምና እንክብካቤ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር ከቤትዎ አይውሉ።
- በተቻለ መጠን ከታመሙ ከሌሎች ሰዎች እና የቤት እንስሳት ርቆ በአንድ ክፍል ውስጥ መቆየት አለብዎት። ያ የማይቻል ከሆነ ከሌሎቹ ቢያንስ በ 6 ጫማ ርቀት ይራቁ።
- በቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች ሰዎች ጋር ከሆኑ ወይም ወደ ሐኪም መሄድ ካለብዎ የፊት መሽፈኛ ያድርጉ።
- እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ቢያንስ ለ 20 ሰከንድ ይታጠቡ። ሳሙና እና ውሃ ከሌሉ በአልኮል ላይ የተመሠረተ የእጅ ማጽጃ ይጠቀሙ።

ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት መቼ እንደሚመለሱ

- ኮቪድ-19 ካለብዎ እና ምልክቶች ከታዩዎት እነዚህ ሦስት ነገሮች ሲከሰቱ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ-

	በመጀመሪያ ምልክቶች ከታዩዎት ቢያንስ 10 ቀናት አልፏል
	ትኩሳትን የሚቀንስ መድኃኒት ሳይወሰዱ ቢያንስ ለ 24 ሰዓታት ምንም ትኩሳት አልነበረዎትም
	ሌሎች ምልክቶችዎ ተሻሻለዋል
- ኮቪድ-19 ካለብዎ እና ምልክቶች ከሌሉዎት ፣ ምርመራዎ ኮቪድ-19 እንዳለብዎ ካሳዩ ከ 10 ቀናት በኋላ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ።

እርስዎ ወይም ልጅዎ ኮቪድ-19 ካለበት ወይም ከተጋለጠ ሰው ጋር ከተገናኘ ምን ማድረግ ይኖርብዎታል

የቅርብ ግንኙነት ምንድነው?

ጭምብል ለብሰው ቢሆን እንኳን ፣ ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ሰው ነዎት የሚባለው፡

- እርስዎ ቢያንስ ለ 15 ደቂቃዎች ኮቪድ-19 ካያዘ ሰው ጋር በ6 ጫማ ርቀት ውስጥ ነበሩ
- እርስዎ ኮቪድ-19 ካያዘው ሰው ጋር በአንድ ቤት ውስጥ ነበሩ
- ኮቪድ-19 ያለበት አንድ ሰው በማስነጠስ፣ በማሳል ወይም በሆነ መንገድ የመተንፈሻ ጠብታዎችን በእናንተ ላይ አሳርፏል

ጓደኛዎ ፣ የቤተሰብዎ አባል ወይም የሥራ ባልደረባዎ ስለሚነግርዎት የቅርብ ግንኙነት እንደነበሩ ሊያውቁ ይችላሉ። እንዲሁም ከጤና መምሪያ ፣ ከፔን መድኃኒት ላንካስተር አጠቃላይ ጤና፣ ከዌልስፓን ፣ ወይም ከላንካስተር ጤና ጣቢያ ከግንኙነት ተከታታይ የሰልክ ጥሪ ሊያገኙ ይችላሉ። ጥሪ ካገኙ የንክኪ ተከታታዩን መመሪያዎች መከተል አስፈላጊ ነው።

የቅርብ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ቤት ውስጥ መቆየት አለባቸው (“በኳራንቲን ውስጥ”)

- የቅርብ ግንኙነት ያሉት ከሆነ ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት አይሂዱ።
- ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር ለመጨረሻ ጊዜ ካተገናኙ በኋላ ለ14 ቀናት በቤትዎ በመቆየት ከሌሎች ይራቁ።
- ኮቪድ-19 ያለበት ሰው በቤተሰብዎ ውስጥ የሚኖር ከሆነ ያ ሰው ከሌሎች ማገገሚያ ከመጣ በኋላ ለ14 ቀናት ያህል በቤትዎ ይቆዩ።
- የሚቻል ከሆነ በቤትዎ ውስጥ ካሉ ሰዎች በተለይም በኮቪድ-19 በከፍተኛ ህመም የመያዝ አደጋ ተጋላጭ ከሆኑ ሰዎች ይራቁ።
- ትኩሳት፣ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት ወይም ሌሎች የኮቪድ-19 ምልክቶችን ይከታተሉ።
- ምልክቶች ካለብዎ በገጽ 2 ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ እና ሐኪም ያነጋግሩ ። የኮቪድ-19 ምርመራ ያስፈልግዎት እንደሆነ ሃኪምዎ ይወስናል።

ወደ ሥራ ወይም ትምህርት ቤት መቼ እንደሚመለሱ

- በኳራንቲን ወቅት ምንም ምልክቶች ከሌሉዎት የ 14 ቀን የኳራንቲንዎን ከጨረሱ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ።
- የሕመም ምልክቶች ከታዩ እና ምርመራዎ ኮቪድ-19 እንዳለብዎት የሚያሳይ ከሆነ፣ በገጽ 3 ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ።
- የበሽታ ምልክቶች ካሳዩ ገር ግን ምርመራው ኮቪድ-19 እንደሌለብዎት ካሳዩ፣ የኳራንቲንዎ ሲጠናቀቅ እና ምልክቶችዎ ከጠፉ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ።

ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን በ www.lancastergeneralhealth.org/covid-19-information ላይ ይጎብኙ። ይህ ሰነድ እ.ኤ.አ. መስከረም 1 ቀን 2020 ተዘምዷል።